

[トップに戻る](#)

## 頭部打撲と頭部2方向レントゲン写真

1. 頭部打撲における頭部2方向レントゲン撮影に関するアンケートです。
2. 私は頭蓋骨の所見より頭蓋内の所見の方が重要と考えているため、頭部2方向ではなくCTを撮影しています。
3. 複数回答して下さい。
4. その他の回答・意見があれば自由に書いて下さい。
5. 連続投票は反映されません。

有効投票 : 379件

回答	項目	得票	割合
<input type="checkbox"/>	A-1 頭部2方向撮影は診断的価値が高い	2	0.5%
<input type="checkbox"/>	A-2 頭部2方向撮影は診断的価値が低い	116	30.6%
<input type="checkbox"/>	B-1 頭部打撲ではほぼ全例で撮影している	12	3.2%
<input type="checkbox"/>	B-2 ケース・バイ・ケースで撮影している	56	14.8%
<input type="checkbox"/>	B-3 あまり撮影していない	50	13.2%
<input type="checkbox"/>	B-4 患者や患者家族が希望すれば撮影	34	9.0%
<input type="checkbox"/>	C-1 頭部2方向撮影は将来的にも必要な検査だろう	9	2.4%
<input type="checkbox"/>	C-2 頭部2方向撮影は将来はなくなる検査だろう	60	15.8%
<input type="checkbox"/>	脳神経外科から要求があり撮影している	8	2.1%
<input type="checkbox"/>	CTが無いので、代替として撮影している	13	3.4%
<input type="checkbox"/>	頭部3方向撮影はルーチンで良いと思う	3	0.8%
<input type="checkbox"/>	CTを第一選択として、骨はCTの骨条件で確認している	15	4.0%
<input type="checkbox"/>	CTのスライスと平行な骨折線はわかりにくいいため頭部単純撮影は必要	1	0.3%

[回答する](#) [リセット](#)

項目を追加する場合  [追加](#)

●●● [Admin](#)